



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)**

**Главам муниципальных
образований
Иркутской области
(по списку)**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

Иркутск 23, а/я 85, 664023

тел. 8(3952) 559-518

E-mail: rshn12@fsvps.gov.ru

<https://38.fsvps.gov.ru>

30.01.2026 № ~~МУ~~ФС-АЛ-04/902

На № _____ от _____
«Информирование»

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» информирует, сибирская язва – опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет. Источником сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, а также термически не обработанная пищевая продукция от них.

Симптомы сибирской язвы: Повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие боли в пояснице и кожные поражения (возможное образование язв).

Инкубационный период продолжается в течение нескольких дней, но может длиться от 8-14 дней или сокращаться до нескольких часов.

Механизмы заражения и пути передачи: контактный – прямой контакт с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, при вскрытии их трупов, снятии шкуры и разделке туш; аэрогенный – реализуемый воздушно-пылевым или воздушно-капельным путями, так как споры сибиреязвенной палочки неограниченно долго сохраняются и могут проникать в дыхательные пути; алиментарный – наблюдается при употреблении недостаточно термически обработанной мясной продукции. Существует возможность передачи инфекции посредством укусов кровососущих насекомых. Заражение человека от человека обычно не наблюдается.

При подозрении на выявление внешних признаков заболевания сибирской язвы у животных следует немедленно обращаться к ветеринарному специалисту населённого пункта. Нельзя допускать вынужденный убой животных и разделку туш без ветеринарного освидетельствования. Для исключения заражения не приобретать мясо у частных лиц на импровизированных рынках.

Профилактика сибирской язвы:

Вакцинация - показана людям, работающим с потенциально заражёнными животными или продуктами животного происхождения, а также в регионах, где регулярно

регистрируются вспышки заболевания. Прививка формирует устойчивый иммунитет, который снижает риск заболевания.

Соблюдение личной гигиены - люди, работающие с животными, должны использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, спецодежда) и тщательно мыть руки после контакта с животными или почвой.

Санитарный надзор - мясная продукция, поступающая на рынок, подлежит строгим проверкам. Покупать продукты животного происхождения следует только в проверенных местах, имеющих все необходимые сертификаты.

Превентивные меры - люди, предположительно контактировавшие с заражёнными животными или продуктами их жизнедеятельности, должны как можно скорее пройти обследование и при необходимости получить профилактическое лечение.


Экстренная профилактика - проводится не позднее 5 суток после контакта с подозрительными объектами, включает курс превентивной антибиотикотерапии. За контактными лицами устанавливается медицинское наблюдение сроком на 14 дней с ежедневным осмотром кожных покровов и измерением температуры тела

Важнейшее значение имеет вакцинация животных и людей из числа групп профессионального риска (зооветеринарные работники и другие лица, профессионально занятые содержанием скота, а также убой, разделкой туш и снятием шкур, лица, занятые сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой сырья животного происхождения).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

А.А. Лим



Исп.: А.В. Серебренникова
8(3952) 559-518 (доб. 01107)